

# SALUD MEDICAL SPANISH CHARTS

## Drug Abuse, Addiction & Dependence

Drug dependence is the compulsive use of a substance.



La dependencia de las drogas es el consumo compulsivo de una sustancia.

Drug dependence can have negative consequences which can be severe.

La dependencia de las drogas puede tener consecuencias negativas, las cuales pueden ser severas.

Addiction is a disease that affects your brain and your behavior.

La adicción es una enfermedad que afecta el cerebro y su comportamiento.

Drug abuse can lead to drug dependence or addiction.

El abuso de drogas puede conducir a la adicción o dependencia de las drogas.

Drug dependence may also follow the use of drugs for physical pain relief.

La dependencia de las drogas también puede presentarse después del uso de drogas para el alivio del dolor físico.

The exact cause of drug abuse and dependence is not known.

La causa exacta de la dependencia y el abuso de drogas se desconoce.

The genetic make-up of the individual, the pharmacology of the particular drug, peer pressure, emotional distress, anxiety, depression, and environmental stress are all factors which seem to be involved.

La composición genética del individuo, la farmacología de cada droga en particular, la presión de compañeros, el sufrimiento emocional, la ansiedad, la depresión y el estrés ambiental son todos factores que parecen estar comprometidos.

Risk factors that predispose people to drug dependence are different from those that predispose to use or abuse.

Los factores de riesgo que predisponen a las personas a la dependencia de las drogas son distintos de los que predisponen al uso o abuso.

Peer pressure may lead to use or abuse, but many of those who go on to addiction have depression, attention-deficit disorder, post-traumatic stress disorder or another psychological problem.

La presión de los compañeros puede llevar al uso o abuso, pero muchos de los individuos que caen en la adicción sufren depresión, trastorno por déficit de la atención, trastorno de estrés postraumático u otro problema sicológico.

People can become addicted to both illegal drugs and drugs that doctors prescribe.

Las personas pueden hacerse adictas tanto a drogas ilegales como a drogas que los médicos prescriben.

Commonly abused illegal drugs include marijuana (pot), hallucinogens (PCP, LSD), methamphetamine (speed, crank, crystal, meth), cocaine and crack, and heroin.

Las drogas ilegales que son abusadas comúnmente incluyen la marihuana (yerba), los alucinógenos como el PCP, el LSD, la metanfetamina (speed, crank, cristal, meth), la cocaína y la pasta de cocaína y la heroína.

When prescription drugs are taken the right way, they are safe and there is little chance of addiction.

Cuando las drogas que son prescritas se toman de la manera adecuada, éstas son seguras y existe muy poca probabilidad de adicción.

Prescription drugs can be dangerous if they are abused.

Las drogas que se prescriben pueden ser peligrosas si se abusa de ellas.

Some of the most commonly abused prescription drugs are painkillers and anti-anxiety drugs.

Algunas de las drogas que se abusan con mayor frecuencia son los calmantes y las drogas para combatir la ansiedad.

Drug intoxication and drug overdose may be accidental or intentional.

La intoxicación y sobredosis de las drogas pueden ser accidentales o intencionales.

You have a problem if you keep craving and using a drug even if it's causing trouble for you.

Usted tiene un problema si usted continúa teniendo antojo de usarlas y si las usa a pesar de que le causan problemas.

The trouble may be with your health, with money, with work or school, or with your relationships with family or friends.

El problema puede ser con la salud, con su dinero, en el trabajo o el colegio o en sus relaciones con familia y amigos.

Your friends and family may be aware you're having a problem before you realize it, because they see changes in your behavior.

Sus amigos y su familia pueden darse cuenta de que usted tiene un problema antes de que usted se dé cuenta de ello puesto que ellos ven los cambios en su comportamiento.

Drug withdrawal symptoms can occur when use of a substance is stopped or reduced.

Los síntomas de abstinencia de una droga se pueden producir cuando se suspende o se reduce el consumo de la sustancia.

Withdrawal symptoms vary, depending on the abused substance.

Los síntomas de abstinencia varían según la sustancia de la que se está abusando.

The onset of withdrawal symptoms depends on the length of time the drug normally stays within the body.

El inicio de los síntomas de abstinencia depende del período de tiempo que la droga normalmente permanece dentro del cuerpo.

# SALUD MEDICAL SPANISH CHARTS

## Drug Abuse, Addiction & Dependence

Drug intoxication, overdose, and withdrawal can be life-threatening in some situations.

Addiction can be treated. But addiction is a chronic, relapsing disease. It may take a number of attempts before you can remain free of drugs or alcohol.

**Breaking your addiction** is the only way to stop the problems drugs are causing in your life.

The first step in breaking addiction is realizing that you control your own behavior.

Below are the first steps to breaking your addiction.

**Commit to quitting.** Once you decide to quit, make plans to be sure you really do it.

Get help from your doctor. He or she can be your biggest ally, even if you're trying to quit a drug he or she prescribed. Your doctor may be able to prescribe medicine that makes you less likely to crave the addictive drug.

**Get support.** There groups are dedicated to helping people who have addictions.

Many support groups are available in the community.

Drinking alcohol during pregnancy can cause physical and mental birth defects.

Nearly three percent of pregnant women use illicit drugs such as marijuana, cocaine, Ecstasy and other amphetamines, and heroin.

These and other illicit drugs may pose various risks for unborn babies and pregnant women.

Your doctor may ask the following questions.

Did you use drugs or alcohol during your pregnancy?

What drug did you use? Hard drugs? Soft drugs?

Did you take more than one drug at the same time?

How often did you take it?

When was the last time you took the drug?

Did you smoke during your pregnancy?

How many cigarettes a day?

Is your baby taking the bottle well?

Is your baby vomiting or having diarrhea?

Is your baby jittery?

Is your baby very fussy or sleeping too much?

Is your baby gaining weight well?

Has your baby had convulsions?

Your baby will need to be hospitalized for observation.

La intoxicación, sobredosis y abstinencia de las drogas pueden ser **potencialmente mortales** en algunas situaciones.

La adicción **puede ser tratada**. Pero la adicción es una **enfermedad crónica y que tiene recaídas**. Puede tomar varios intentos antes de que usted pueda **permanecer libre de las drogas** o del alcohol.

**Romper con su adicción** es la única manera de acabar con los problemas que las drogas le están causando en su **vida**.

**El primer paso para romper con** una adicción es dándose cuenta que usted controla su propio comportamiento.

A continuación los primeros pasos para romper con su adicción.

**Comprométase a parar.** Una vez decida dejar de usarlas haga planes para asegurarse de que lo hace realmente.

Consiga **ayuda** de su médico. Él o ella puede ser su mejor aliado, a pesar de que usted esté tratando dejar un medicamento que él o ella le recetó. Su médico puede prescribirle un medicamento que haga que usted tenga menos antojos por la droga a la cual usted está adicto.

**Consiga apoyo.** Hay grupos que están dedicados a ayudar a las personas que tienen adicciones.

En la comunidad hay muchos **grupos de apoyo** disponibles.

Beber alcohol **durante el embarazo** puede hacer que su bebé nazca con defectos de nacimiento físicos y mentales.

Aproximadamente el tres por ciento de **mujeres embarazadas** toman drogas ilícitas como marihuana, cocaína, Ecstasy y otras amfetaminas y heroína.

Estas y otras drogas ilícitas pueden **plantear varios riesgos** tanto para el **desarrollo del feto** como para la mujer embarazada.

Su médico le puede hacer las siguientes **preguntas**.

¿Tomó drogas o bebidas alcohólicas durante su embarazo?

¿Qué tipo de droga tomó? ¿**Drogas duras?** ¿**Drogas blandas?**

¿Usó más de una droga al mismo tiempo?

¿Qué a menudo la usaba?

¿Cuándo fue la última vez que tomó la droga?

¿**Fumó usted** durante el embarazo?

¿Cuántos cigarillos al día?

¿Su bebé está **tomando bien el biberón**?

¿Su bebé está vomita o tiene diarrea?

¿Su bebé está **inquieto**?

¿Su bebé está muy **irritable** o **duerme demasiado**?

¿Su bebé está ganando peso bien?

¿Ha tenido convulsiones su bebé?

Su bebé tendrá que ser ingresado en el hospital para observarlo.

**www.saludmedicalspanish.com**

Ed News en Español

PO Box 27237

Albuquerque, NM 87125-7237

Copyright © 2005 Bonifacio Contreras

ISBN: 1-881050-49-1



Valley Community Interpreters  
Intérpretes Comunitarios del Valle